

## INFECCION DEL TRACTO URINARIO

### **HALLAZGOS DIAGNOSTICOS**

- Dolor al orinar.
- Urgencia o mucha frecuencia para orinar.
- Pantalones mojados durante el día o la noche.
- Orina fétida.
- Fiebre.
- Dolor de estómago.
- Vómito.

### **PREVENCION DE LAS INFECCIONES URINARIAS**

- Lave el área genital con agua, no con jabón.
- No ponga burbujas para baño ni champú dentro de la tina del baño, no deje la barra de jabón flotando.
- Enséñele a su niña a limpiarse correctamente de adelante hacia atrás.
- Anímela a que tome suficiente líquido cada día para mantener la orina de color claro.
- Anímela a que orine cada 3 a 4 horas y no que se "aguante".
- Haga que vista ropa interior de algodón. Evite que use ropa interior de noche.

### **LLAME AL CONSULTORIO**

#### ***Inmediatamente sí:***

- La fiebre y el dolor para orinar no desaparecen después que su niña a tomado el antibiótico por 48 horas.
- Su niño puede orinar sólo pequeñas cantidades.
- La orina presenta sangre.
- EL niño se ve muy enfermo.

#### ***Dentro de las 24 horas:***

- Su niño no quiere tomar el antibiótico.
- Su niño empeora mientras está tomando la medicina.
- Si tiene otras preocupaciones o preguntas.

Dr. Reynaldo de Avila móvil 776 65559  
591-3375800 Santa Cruz Bolivia

Adaptado de Barton D. Schmitt. Instructions for Pediatric Patients. Second Edition. Saunders 1999.